

F 3	CAPUCINS ( <i>Lonchura</i> , <i>Lemuresthes</i> , <i>Heteromunia</i> )			
Jugés sur deux ans				
Noms vernaculaires	Noms latins	BAGUES	Individuel	Stam
Capucin Bec d'argent	<i>Lonchura cantans</i>	2.2	10	11
Capucin Bec d'argent brun			12	13
Capucin Bec d'argent à ventre foncé			14	15
Capucin Bec d'argent brun à ventre foncé			16	17
Capucin Bec d'argent crème-ino			18	19
Capucin Bec d'argent autres mutations			20	21
Capucin Bec de plomb	<i>Lonchura malabarica</i>	2.2	22	23
Capucin Bec de plomb mutations			24	25
Capucin à tête grise	<i>Lonchura griseicapilla</i>	2.2	26	27
Capucin à tête grise mutations			28	29
Capucin de Madagascar	<i>Lemuresthes nana</i>	2.2	30	31
Capucin nonnette	<i>Lonchura cucullata</i>	2.2	32	33
Capucin bicolore	<i>Lonchura bicolor bicolor</i>	2.2	34	35
Capucin à dos noir	<i>Lonchura bicolor poensis</i>	2.2	36	37
Capucin à dos brun	<i>Lonchura bicolor nigriceps</i>	2.2	38	39
Capucin pie	<i>Lonchura fringilloides</i>	2.5	40	41
Capucin domino	<i>Lonchura striata</i>	2.5	42	43
Capucin damier	<i>Lonchura punctulata</i>	2.5	44	45
Capucin jacobin	<i>Lonchura molucca</i>	2.5	46	47
Capucin javanais	<i>Lonchura leucogastroides</i>	2.5	48	49
Capucin à ventre blanc	<i>Lonchura leucogastra</i>	2.5	50	51
Capucin à capuchon	<i>Lonchura spectabilis</i>	2.5	52	53
Capucin coloré	<i>Lonchura quinticolor</i>	2.5	54	55
Capucin à dos marron	<i>Lonchura malacca</i>	2.5	56	57
Capucin à tête noire	<i>Lonchura atricapilla</i>	2.5	58	59
Capucin marron	<i>Lonchura ferruginosa</i>	2.5	60	61
Capucin à tête blanche	<i>Lonchura maja</i>	2.5	62	63
Capucin pâle	<i>Lonchura pallida</i>	2.5	64	65
Capucin des Arfak	<i>Lonchura vana</i>	2.5	66	67
Capucin de Nevermann	<i>Lonchura nevermanni</i>	2.5	68	69
Capucin gris	<i>Lonchura caniceps</i>	2.5	70	71
Capucin à croupion jaune	<i>Lonchura flavigaster</i>	2.5	72	73
Capucin donacole d'Australie, de Nouvelle Guinée et Papouasie	<i>Lonchura c. castaneothorax assimilis, ramsayi, boschmai, uropygialis</i>	2.5	74	75
Mutations Capucin donacole d'Australie, de Nouvelle Guinée et Papouasie		2.5	76	77
Sous-espèce Capucin Donacole sharpei	<i>L. castaneothorax sharpei</i>	2.5	78	79
Mutations Sous-espèce Capucin Donacole sharpei		2.5	80	81
Capucin à poitrine blanche	<i>Heteromunia pectoralis</i>	2.5	82-1	82-2
Capucin de Hunstein	<i>Lonchura hunsteini hunsteini</i>	2.5	84	85
Capucin de Nouvelle Hanovre	<i>Lonchura hunsteini nigerrima</i>	2.5	86	87
Capucin tacheté	<i>Lonchura leucosticta</i>	2.5	88	89
Capucin à tête rayée	<i>Lonchura tristissima</i>	2.5	90	91
Capucin à ventre crème	<i>Lonchura pallidiventer</i>	2.5	92	93
Capucin sombre	<i>Lonchura fuscans</i>	2.5	94	95
Capucin noir	<i>Lonchura stygia</i>	2.5	96	97
Capucin de la Nouvelle Bretagne	<i>Lonchura melaena</i>	2.5	98	99
Capucin à ventre roux	<i>Lonchura kelaarti</i>	2.5	100	101
Capucin de la Nouvelle Irlande	<i>Lonchura forbesi</i>	2.5	102	103
Capucin à poitrine noire	<i>Lonchura teerinki</i>	2.5	104	105
Capucin des Snow	<i>Lonchura montana</i>	2.5	106	107
Capucin des montagnes	<i>Lonchura monticola</i>	2.5	108	109
Grand capucin	<i>Lonchura grandis</i>	2.7	110	111
Mutations des classes F3.30 à F3.71 et de F3.84 à F3.115		2.5	112	113