Compte rendu de la 18 ième journée technique Bruxelles 07 juin 2008 Rencontre internationale canaris couleurs

Jean-Albert EUDE

Commission Nationale des Juges de France

Agenda de la journée technique internationale

- **Contexte**
  - Samedi 07/06/08 à Bruxelles (Forest) dans le bâtiment de l'AOB

- **Ordre du jour**
  - 9H30-10H30 : Critères de jugement du brun jaune intensif – schimmel (AOB)
  - 10H30-11H30 : Facteur azul (KBOF)
  - 11H30-13H00 : Critères de jugement de l'agate blanc : dessin et lipochrome (NBvV)
  - 13H30-14H00 : Coloration des rémiges chez les lipochromes jaunes et rouges
  - 14H00-15H00 : (CNJF)
    - Partage d'une même vocabulaire
    - Vision de la pigmentation d'un canari NOIR
    - Rappel de la représentation de la mélanine d'un canari au standard CNJF
    - Présentation du Jaspé
  - 15H00-17H00 : diner et poursuite des échanges techniques
  - 17H00 : fin de la journée technique

Juges et fédérations participant à la journée technique internationale

Federation	Nom	e-mail adresse
AOB	Johan Van der Maelen	Johan.vandermaelen@minsoc.fed.be
	Freddy Van Hauwermeiren	freddy.van.hauwermeiren@skynet.be
	Marc De Jaeger	Marc.de.jaeger2@telenet.be
	Pierre Hoeks	pierrehoeks@skynet.be
	Gregory Cobbaut (vertegenwoordiger NOK)	g.cobbaut@hotmail.com
KBOF	Jan Van Overvelt	j.vanovervelt@skynet.be
	Maurice Kestemont	Maurice.kestemont@skynet.be
NBvV	Jac Meesters	Jra.meesters@hetnet.nl
	Gerrit Hauwen	Gerrit.houwen@hecnet.nl
		p.t.vandertuin@planet.nl
ANBvV	Arie Koek	a.koek@chello.nl
	Peter van Esch	petervanesch@planet.nl
CNJF (Fr)	Jean-Albert Eude	Jean-albert.eude@socgen.com
		Jaeude@caramail.com
AZ (Dtsld)	Debus Bernd	Bech.debus@t-online.be

9H30 : Introduction de Johan Van Der Maelen

- **Toutes les organisations invitées sont présentes**
- **Objectifs : former un groupe de travail**
  - **Bonne collaboration pour amener plus d'uniformité**
  - **Indispensable pour l'avenir**
- **Urgence : avoir la même vision des séries classiques pour pouvoir ensuite travailler sur les mutations**
- **Ce qui sera débattu devra être retenu dans les différentes associations nationales et internationales**

9H30-10H30 : Critères de jugement du brun jaune intensif – schimmel (AOB)

- **Attitude vis-à-vis des modifications du standard du brun apparues en septembre 08 avec une demande d'application en octobre 08 à Mâlines**
  - Refus de tous les pays
  - Disparition dans les nouvelles de la COM des termes «stries interstrie 50-50%» (Piacenza)
    - ✓Demande de modification à réaliser
- **Discussion sur la présence de mélanine en interstrie**
  - Présentation JAE avec dessin de la disposition des pigments mélaniques et lipochrome d'une plume de brun
    - ✓ Vision commune mais les termes employés sont différents
    - ✓ Décision de ne plus utiliser «phaéomélanine» portant confusion mais de décrire la couleur visible
    - ✓ Terme à trouver pour la prochaine réunion
  - Accord sur un fond oxydé de mélanine comme chez les noirs et pas uniquement du lipochrome
- **Importance d'existence des stries sur les flancs**
- **Couleur des stries : brune foncée mais pas noire**
- **Couleur des pattes et ongles : brunâtres et homogènes**

11H30-13H00 : Critères de jugement de l'agate blanc : dessin et lipochrome (NBvV)

- **Demande AOB : ajout dans le standard COM de « fond légèrement oxydé gris clair»**
  - **L'interstrie doit faire apparaître un fond légèrement oxydé gris clair de mélanine et pas uniquement du lipochrome**
- **Front éclairci (CNJF) = mélanine refoulée en bordure du bec mais présente pour laisser apparaître plus d'intensité dans le lipochrome (AOB)**
- **Importance de existence des stries sur les flancs et des moustache**
- **Couleur des stries : grise mais pas noire**
- **AOB : bavette ou collier de mélanine sous le bec non pénalisé même si accord que cela vient du mosaique**
- **Couleur du bec, des pattes et ongles :**
  - **Uniforme et homogène**
  - **«légèrement coloré» ou «mélanisation minimaliste grise uniforme»**
  - **Discussion animée du terme «clair» versus «blanc non coloré» : réponse éventuelle aux italiens**

2 interstries différentes

2 interstries différentes

Bavette de mélanine

Différence de réduction entre Remiges (dilution) et rectrices

10H30-11H30 : Facteur azul (KBOF)

- **Accord collégial pour ne pas demander de création de classes spécifiques azul**
- **Reconnaissance de la mutation génétique du facteur azul**
  - **hérédité libre et récessive**
- **Juger les canaris azuls et non azuls d'une manière identique selon le type existant dans les standards**

Interstrie mélanisée

Agate ou noir blanc azul ?

Dilution externe des rémiges

13H30-14H00 : Coloration des rémiges chez les lipochromes jaunes et rouges

- **Rappel du standard CNJF :**
  - La coloration jaune plus ou moins uniforme des rémiges et rectrices est secondaire toutefois à tonalité égale sur le corps il sera préféré l'oiseau présentant les rémiges et rectrices de tonalité uniforme et en harmonie avec la couleur du corps

- **Demande AOB en accord avec les autres pays**
  - Préférer l'oiseau présentant les rémiges et rectrices de tonalité uniforme et en harmonie avec la couleur du corps
  - Dans le cas contraire demander l'ouverture de nouvelles classes



14H00-15H00 : CNJF

- **Discussion sur la présence de mélanine en interstrie**
  - **Présentation JAE avec dessin de la disposition des pigments mélaniques et lipochrome d'une plume de brun**
    - ✓ **Vision commune mais les termes employés sont différents**
    - ✓ **Décision de ne plus utiliser «phaéomélanine» portant confusion mais de décrire la couleur visible**
    - ✓ **Terme à trouver pour la prochaine réunion**

Rappel de la représentation de la mélanine d'un canari au standard CNJF

OXYDES : **tonalité maximum de l'eumélanine sur l'axe central des plumes sur toute la longueur**

Strie : larges, longues, alignées et continues => Forme un dessin dorsal de rayures larges parallèles
Proportion strie – interstrie intensif = 50% - 50% & schimmel-mosaique = 60%- 40%

Interstrie : fond mélanisé de noir dépourvu de brun

Type NOIR : n+ rb+
Oxydation maximale
- **eumélanine noire**

Absence de
- **phaéomélanine**

MUTATION NOIRE EN BRUNE

Type BRUN : n rb+
Oxydation maximale
- **eumélanine brune**

Absence de
- **phaéomélanine**

REDUCTION

REDUCTION

Type AGATE : n+ rb
Oxydation réduite
- **eumélanine noire (n+)**

Absence de
- **phaéomélanine (rb)**

MUTATION NOIRE EN BRUNE

Type ISABELLE : n rb
Oxydation réduite
- **eumélanine brune**

Absence de
- **phaéomélanine**

DILUES : **réduction de la tonalité et de la quantité de l'eumélanine sur l'axe central des plumes**
Strie fines,courtes, alignées et discontinues => Forme un dessin dorsal de rayures fines interrompues

Interstrie : fond mélanisé de gris argenté dépourvu de brun

Vision de la pigmentation d'un canari NOIR



Pigmentation d'un canari noir normal

Pas au standard CNJF

Absence de phaeomélanine



Pigmentation d'un noir sans phaeomelanine

standard CNJF

14H00-15H00 : CNJF

- **Présentation JA EUDE de l'étude sur le Jaspé**